

استانداردهای ملی بذر کلم ها

الف) استاندارد تولید بذر کلم ها - مزرعه

طبقه بذری			عوامل		
سوپر الیت	مادری	گواهی شده			
۲	۲	۲	تناوب (حداقل سال)		
۱۶۰۰	۱۴۰۰	۱۰۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)		
۱/۲۰۰۰	۱/۲۰۰۰	۱/۱۰۰۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)		
*	*	*	علف های هرز (حداکثر تعداد بوته در مترمربع)		
**	**	**	آفات		
۰/۱	۰/۵	۱	Turnip mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۰/۱	۰/۵	۱	Pseudomonas sp.	پروکاریوت ها	
			Xanthomonas campestris pv. campestris		
۰/۱	۰/۲	۰/۵	Albogo candida Alternaria brassica	قارچ ها	
–	–	–	Dytilenchnus dipsaci	نماتدها	

حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

** در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.

ب) استاندارد تولید بذر کلم ها - آزمایشگاه

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپر الیت			
۹۹	۹۹	۹۹	خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
۱	۱	۱	مواد جامد (حداکثر در صد)		
۰/۲۵	۰/۱	۰/۰۵	بذر سایر محصولات		
*	*	*	حداکثر بذر سایر علفهای هرز		
۰/۲۵	۰/۱	۰/۰۵	حداکثر بذر سایر ارقام		
۸۵	۸۵	۸۵	قوه نامیه (حداقل درصد)		
۷	۷	۷	رطوبت بذر (حداکثر درصد)		
–	–	–	Turnip mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	<i>Pseudomonas</i> sp.	پروکاریوت ها	
			<i>Xanthomonas campestris</i> <i>Pv. campestris</i>		
–	–	–	<i>Albogo candida</i> <i>Alternaria brassica</i>	قارچ ها	
–	–	–	<i>Dytilenchnus dipsaci</i>	نماتدها	