

استانداردهای ملی بذر تره فرنگی

استاندارد مزرعه تولید بذر تره فرنگی

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل تناوب (سال)	۲	۲	۱
فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰
حداکثر بوته سایر ارقام	۱/۱۰۰۰	۱/۱۰۰۰	۲/۱۰۰۰
حداکثر بوته علف های هرز	*	*	*
آفات	**	**	**
<u>بیماری های بذر زاد (درصد)</u>			
ویروس: <i>Onion mosaic virus</i>	۰	۰	۱
قارچ: <i>Fusarium spp.</i>	۱/۱۰۰۰	۵/۱۰۰۰	۱۰/۱۰۰۰
نماتد: <i>Ditylenchus dipsaci</i>	۱/۱۰۰۰	۱/۱۰۰۰	۵/۱۰۰۰

* توصیه فنی مزرعه درمورد همه گیاهان وجینی پاک بودن مزرعه از علف های هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

** در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه جهت کنترل، طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.

*** در صورت آلودگی مزرعه به Pink Rot بایستی در آن مزرعه ، حداقل ۳ سال تره فرنگی کشت نشود.

استاندارد بذر تره فرنگی

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل خلوص فیزیکی (در صد)	۹۸	۹۸	۹۸
حداکثر مواد جامد (در صد)	۲	۲	۲
حداکثر تعداد بذر سایر محصولات (درصد)	۰	۰/۱	۰/۵
حداکثر تعداد بذر علف های هرز غیرمجاز در	۰	۰	۰
حداقل قوه نامیه (درصد)	۷۰	۷۰	۷۰
حداکثر رطوبت بذر (درصد)	۸	۸	۸
بیماری های بذر زاد (درصد)	۰	۰/۱	۰/۲
قارچ: <i>Fusarium oxysporum</i> <i>F sp ceap</i>	۰/۰۱	۰/۱	۰/۵